

Raportul Proteină ÷ Creatinină din Urină – Protocol de Diagnostic

Testarea raportului UPC al Skyla VB1 – dintre proteină și creatinină din urină – poate ajuta medicul veterinar să depisteze boli ale rinichilor înainte ca animalul să sufere de azotemie. Mai poate fi utilizat pentru monitorizarea răspunsului la tratamentul bolilor de rinichi și pentru determinarea precisă a stării bolii.

- După ce medicul veterinar a parcurs istoricul medical al animalului și a efectuat examinarea fizică
- În corelație cu analizele de sânge și de biochimie, analiza urinei (pentru reziduuri și sedimentare specifică) și alte teste – pot diagnostica și alte afecțiuni ale rinichilor.
- Testele de urină trebuie efectuate în interval de 30 minute pentru a evita obținerea de rezultate incorecte.

Note:

- Sedimentarea specifică a urinei animalului este proporțională cu cantitatea de apă consumată. Sedimentarea specifică trebuie testată de mai multe ori pentru a obține o valoare relevantă.
- O descreștere a sedimentării specifice a urinei poate fi deasemenea cauzată de o boală cronică a rinichilor, insuficiență renală, piometru etc.
- O creștere a sedimentării specifice a urinei poate reprezenta deshidratare, diaree, pierdere de sânge, sau alte boli ale animalului.

